



Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı
Olgu Sunumu

12 Temmuz 2016 Salı


Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. M. Tuba Çöğürlü

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Alerji-İmmünoloji Bilim Dalı

12.07.2016

Dr. M. Tuba ÇÖĞÜRLÜ

- 
- 6 aylık erkek hasta
 - Aktif şikayeti egzema..

Hikaye

- 2. ayda başlayan, yanaklarda, gövdede, antekubital ve popliteal bölgede kuruluk, kızarıklık, ara ara tüm vücutta yaygın kızarıklık..
- 4. ayda dış merkez başvurusunda inek sütü veya yumurta alerjisi olabileceği söylenerek anne süt ve yumurta diyetine alınmış, şikayetler bir miktar gerilemiş..
- Anne süt diyetini ara ara kaçırmasına rağmen sorun yaşamamış..

Özgeçmiş

- Miadında, NSVY ile 2950 gr. doğmuş.
- Postnatal sıkıntısı olmamış.
- Anne 27 y. Allerjik rinit..
- Baba 30 y.
- Anne-baba akraba değil.
- 1.çocuk hastamız

Fizik muayene

- Cilt kuruluđu..
- Antekubital ve popliteal bölgede hafif likenifikasyon..

Laboratuvar

- Eos:465 (%7)
- T.IgE:350mg/dl
- **Gıda cilt testi:**
- Histamin:6mm
- İnek sütü ticari prik:0 mm
- İnek sütü prik to prik:0 mm
- Yumurta beyazı ticari prik:8 mm
- Yumurta sarısı ticari prik:7 mm
- Yumurta prik to prik:10 mm

- **Spesifik IgE:**
- İnek sütü < 0,1 kU/L
- Yumurta sarısı: 6,4 kU/L
- Yumurta beyazı: 7 kU/L
- Buğday < 0,1 kU/L

Anamnez

- Birkaç kez çorba içtikten sonra bebekte döküntü..



Yumurta Alerjisi

- 2. en sık karşılaşılan gıda alerjisi
- İlk 3 yaşta %0,5-2,5
- Ovomucoid
- Ovalbumin
- Ovotransferrin
- Lysozyme
- Ovomucin



Klinik Bulgular

- **IgE aracılı reaksiyonlar (en sık):** Ürtiker, anjioödem, respiratuar bulgular, laringeal ödem, anafilaksi..
- **Mixed ve Non-IgE aracılı reaksiyonlar:** Atopik dermatit ve gastrointestinal reaksiyonlar (eosinofilik özofajit..)
- **FPIES (Food protein-induced enterocolitis syndrome):** 2-6 saatte kusma, letarji, diyare.. %11 yumurta..

Doğal seyir..

- Okul çağında tolerans..
- Prognostik faktörler: Spesifik IgE , erken başlangıç, hafif semptomlar, cilt testi endürasyonunun boyutu..



Tanı

- Anamnez..
- Spesifik IgE (>2 yaş >7 kU/L)
(<2 yaş >2 kU/L)
- Cilt testi (>2 yaş >7mm)
(<2 yaş >5mm)
- Yama testi
- Oral provokasyon.. Altın standart..
- Çift kör plasebo kontrollü oral provokasyon testi...

izlem

- Eliminasyon..
- Çapraz reaksiyon verebilen gıdaların eliminasyonu..
- İnfluenza, Sarı humma ve KKK aşıları..
- Lipid emülsiyonları..(propofol, intralipid..)
- Pişmiş gıda ile oral provokasyon..
- Epinefrin..



Plan

- İnek sütü diyetini açmak..
- Atopik dermatit tedavisi..
- **Oral provakasyon testleri;**
- Anne fırınlanmış gıda (yumurtalı kek 180 derecede 30 dk pişmiş)
- Anne tam pişmiş yumurta..
- Bebek yumurtalı kek..
- Bebek tam pişmiş yumurta..
- 9 ya da 12. ay KKK aşısı..



